

Exercice 1 : (3 points)

Cet exercice se présente comme un questionnaire à choix multiples (QCM).

Les trois questions sont indépendantes.


Pour chaque question, il y a une seule conclusion correcte. Indiquer le numéro et la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1 ABCD est un tétraèdre.

I est le milieu de [AB] et J celui de [AD]

K est le point du segment [AC] vérifiant : $AK = \frac{2}{3} AC$


- a) Les droites (IJ) et (CD) sont sécantes.
- b) La droite (IJ) coupe le plan (BCD)
- c) Les droites (KI) et (CB) sont sécantes.



2 ABCDEFGH est un cube.

I est le milieu de [AC], J celui de [DG] et K celui de [BF]

- a) Le triangle EGK est rectangle.
- b) Le triangle I J K est isocèle
- c) La droite (IJ) est parallèle au plan (BCF)




3 ABCD est un tétraèdre

I est un point de [AD]

J est un point de [AB]

K un point de [AC]

- a) IJK est un triangle équilatéral.
- b) La droite (CB) coupe le plan (IJK) en B.
- c) Les points L, M et N sont alignés.



Exercice 2 : (6 points)

La capacité vitale est le volume d'air maximal pouvant être mobilisé en une seule inspiration. Sur un échantillon de 17 personnes, on a mesuré la capacité vitale (en litres). Voici la liste des résultats :

4,15	4,48	5,24	4,8	4,95	4,05	4,3	4,7	5,51	4,58	4,12	5,7	4,85	5,05	4,65	4,7	4,28
------	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	------	-----	------

1. Déterminer l'étendue E et la moyenne \bar{C} de cette série. Arrondir la moyenne au centilitre près.

2. On décide de regrouper les valeurs de la série par classes.

a) Compléter le tableau suivant :

capacité vitale (en litres)	[4 ; 4,5[[4,5 ; 5[[5 ; 5,5[[5,5 ; 6[
effectifs				
effectifs cumulés croissants				

b) Déterminer le premier quartile Q_1 , le troisième quartile Q_3 et la médiane M de cette série.

3. a) Compléter le tableau suivant :

capacité vitale (en litres)	[4 ; 4,5[[4,5 ; 5[[5 ; 5,5[[5,5 ; 6[Total
Centre des classes c_i					
effectifs n_i					
$n_i \cdot c_i$					
$n_i \cdot c_i^2$					

b) Déterminer la moyenne \bar{X} puis la variance V arrondi à 10^{-2} près.

Exercice 3 : (6 points)

Soit la fonction f définie sur \mathbb{R}^* par : $f(x) = \frac{8}{x}$.

On a tracé sa représentation graphique dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ orthonormé.

Soit les fonctions g et h définies sur \mathbb{R} par : $g(x) = x^2$ et $h(x) = 4x - 4$.

1. Représenter graphiquement les fonctions g et h sur le graphique joint.

On notera \mathcal{E}_g et \mathcal{E}_h les représentations graphique de ces fonctions.

2. a) Démontrer que la courbe \mathcal{E}_g coupe \mathcal{E}_h en un point A dont on déterminera les coordonnées.

b) Démontrer (par le calcul) que la courbe \mathcal{E}_g est au-dessus de \mathcal{E}_h .

3. a) Démontrer que la courbe pour tout réel non nul x : $f(x) - h(x) = \frac{4(x+1)(2-x)}{x}$

b) Démontrer que \mathcal{E}_h et \mathcal{E}_f se coupent en deux points dont on déterminera les coordonnées.

b) Résoudre l'inéquation : $f(x) < h(x)$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

Exercice 4 : (5 points)

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(3, -1)$, $B(7, 1)$ et $C(4, 2)$.


1. Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A .

2. Vérifier qu'une de la droite (D) parallèle à la droite (AB) et passant par C est : $x - 2y = 0$.

3. Déterminer les coordonnées du centre I et le rayon R du cercle circonscrit (\mathcal{C}) au triangle ABC .

4. Montrer que (D) est la tangente au cercle (\mathcal{C}) en C .

Nom :



Exercice 1 :

1. c ; 2. b ; 3. c

Exercice 2 :

4,15	4,48	5,24	4,8	4,95	4,05	4,3	4,7	5,51	4,58	4,12	5,7	4,85	5,05	4,65	4,7	4,28
------	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	------	-----	------

1. L'étendue de cette série est : $E = 5,7 - 4,05 = 1,65$

la moyenne de cette série est : $\bar{C} = 4,71$

2. a)

capacité vitale (en litres)	[4 ; 4,5[[4,5 ; 5[[5 ; 5,5[[5,5 ; 6[
effectifs	6	7	2	2
effectifs cumulés croissants	6	13	15	17

L'effectif total est $N = 17$.

b) $\frac{N}{4} = 4,25$ donc Le premier quartile est $Q_1 = 4,25$

$\frac{3N}{4} = 12,75$ donc le troisième quartile est $Q_3 = 4,75$.

$$\frac{N+1}{2} = 9 \quad \left| \begin{array}{|c|c|} \hline 4,25 & 6 \\ \hline M & 9 \\ \hline 4,75 & 13 \\ \hline \end{array} \right| \quad \frac{M - 4,25}{4,75 - 4,25} = \frac{9 - 6}{13 - 6} \text{ équivaut à } \frac{M - 4,25}{0,5} = \frac{3}{7} \text{ d'où } M \approx 4,46$$

3. a)

capacité vitale (en litres)	[4 ; 4,5[[4,5 ; 5[[5 ; 5,5[[5,5 ; 6[Total
Centre des classes c_i	4,25	4,75	5,25	5,75	
effectifs n_i	6	7	2	2	17
$n_i \cdot c_i$	25,5	33,25	10,5	11,5	80,75
$n_i \cdot c_i^2$	108,375	157,9375	55,125	66,125	387,5625

b) La moyenne de cette nouvelle série est : $\bar{X} = \frac{80,75}{17} = 4,75$

La variance de cette nouvelle série est : $V = \frac{387,5625}{17} - (4,75)^2 \approx 0,24$.

Exercice 3 :

1° \mathcal{E}_g est une parabole de sommet O et d'axe la droite des ordonnées .

h est affine donc \mathcal{E}_h est la droite passant par les points de coordonnées respectives (0, -4) et (1, 0).

Voir figure.

2° a) $g(x) = h(x)$ équivaut à $x^2 = 4x - 4$ équivaut à $x^2 - 4x + 4 = 0$ équivaut à $(x - 2)^2 = 0$ équivaut à $x = 2$.

Donc A(2, 4).

b) Pour tout x réel, $g(x) - h(x) = (x - 2)^2 \geq 0$ donc \mathcal{E}_g est au dessus de \mathcal{E}_h .

$$\begin{aligned} 3^\circ \text{ a) } f(x) - h(x) &= \frac{8}{x} - (4x - 4) = \frac{8}{x} - 4x + 4 = \frac{8}{x} - \frac{4x^2}{x} + \frac{4x}{x} = \frac{8 - 4x^2 + 4x}{x} = \frac{8x - 4x^2 + 8 - 4x}{x} \\ &= \frac{4(2x - x^2 + 2 - x)}{x} = \frac{4(x + 1)(2 - x)}{x}. \end{aligned}$$

b) $f(x) = h(x)$ équivaut à $f(x) - h(x) = 0$ équivaut à $\frac{4(x + 1)(2 - x)}{x} = 0$ équivaut à $x = -1$ ou $x = 2$.


Ainsi \mathcal{E}_f et \mathcal{E}_h se coupent aux points B(-1, -8) car $\frac{8}{-1} = 4 \times (-1) - 4 = -8$ et C(2, 4) car $\frac{8}{2} = 4 \times 2 - 4 = 4$.

Remarquons que A = C.

$$\text{c) } f(x) \leq h(x) \Leftrightarrow f(x) - h(x) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{4(x + 1)(2 - x)}{x} \leq 0$$

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$	
x + 1	-	0	+	+	+	
2 - x	+	+	+	0	-	
x	-	-	0	+	+	
	+	0	-	+	0	-

$$S = [-1, 0[\cup [2, +\infty[$$



Exercice 4 :

1. On a : $CA = \sqrt{(3-4)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$

Et $CB = \sqrt{(7-4)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ donc $CA = CB$.

D'autre part : $\overrightarrow{CA} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc $(-1).3 + (-3).(-1) = -3 + 3 = 0$ d'où $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$.

Ainsi , ABC est un triangle isocèle et rectangle en C.

2. Une équation cartésienne de la droite (D) est $x - 2y = 0$ donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (D).

Comme $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ d'où \vec{u} et \overrightarrow{AB} sont colinéaires et par suite (D) est parallèle à (AB).

Or $4 - 2.2 = 4 - 4 = 0$ donc C appartient à (D).

La droite (D) est donc la parallèle à la droite (AB) passant par C.

3. Comme le triangle ABC est isocèle et rectangle en C alors le centre I du cercle circonscrit (\mathcal{C}) au triangle ABC est le milieu du segment [AB] et son rayon est $R = IA$.

$I(5, 0)$ et $R = IA = \sqrt{(3-5)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$.

4. $d(I, D) = \frac{|5 + 2.0|}{\sqrt{1+4}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = R$ donc (D) est une tangente au cercle (\mathcal{C}) et comme C est un point

commun à (D) et au cercle (\mathcal{C}) alors (D) est la tangente à (\mathcal{C}) en C.